К основным причинам употребления ПАВ детьми и подростками можно отнести:

- Любопытство.
- 2. Давление группы, отсутствие навыка отказа.
- 3. Неудачная попытка решить семейные и/или школьные проблемы, установить дружеские отношения со сверстниками.
- 4. Сенсация, возможность привлечь внимание.
- 5. Скука, неумение интересно проводить свободное время, отсутствие навыков самоорганизации.

Уважаемые родители!

Если у ребенка наблюдается 3-5 признаков употребления ПАВ, настоятельно рекомендуем обратиться к администрации Вашего образовательного учреждения и в поликлинику к врачу-педиатру или детскому психиатру.

Контактные телефоны:

8(4967)39-73-94 Комиссия по делам

несовершеннолетних г.о. Серпухов

8(4967)72-74-74 Инспектора отдела по делам

несовершеннолетних г.о. Серпухов

Муниципальное методическое объединение педагогов-психологов г.о. Серпухов

Убедительная просьба не пытаться откладывать консультацию у специалиста на «потом», т.к. последствия игнорирования вопроса могут быть непредсказуемыми.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Внимание! Опасность рядом!»



г.о. Серпухов, 2020

Материалы предоставлены: специалистами МБОУ ДО ППМС центра «Шанс»

Симптомы употребления ПАВ ребенком

- 1. Неконтролируемая жестикуляция, неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта.
- 2. Беспричинный смех.
- 3. Присутствие дефектов речи.
- 4. Перепады настроения.
- 5. Заторможенность, сменяющаяся излишней импульсивностью.
- 6. Повышенное слюноотделение.
- 7. Красные и воспаленные глаза с расширенными зрачками.
- 8. Кашель, постоянное чувство жажды, частый пульс.
- 9. Повышенная сухость кожи.
- 10. Обилие прыщей на коже лица и тела.
- 11. Землистый или бледный цвет лица.
- 12. Нарушение сна: много спит или перестает спать.
- 13. Повышенный аппетит или его отсутствие.
- 14. Утрата связи с реальностью.
- 15. Приступы паники и страха, раздражительность.
- 16. Образы при закрытых глазах.
- 17. Отсутствие ощущения боли и инстинкта самосохранения.
- 18. Зрительные, тактильные и слуховые галлюцинации.
- 19. Отсутствие ощущения тела, чувство «невесомости».
- 20. Амнезия.

Муниципальное методическое объединение педагогов-психологов г.о. Серпухов

Первые настораживающие признаки употребления ребенком ПАВ

- 1. Проводит большую часть времени с людьми, не вызывающими доверия взрослых.
- 2. Постепенно теряет интерес к прежним своим увлечениям, не приобретая при этом новых.
- 3. Долгое отсутствие дома, при этом из дома пропадают вещи.
- 4. Замкнутость в отношениях с родителями, незаинтересованность происходящими событиями в семье.
- 5. Постоянно просит деньги, не понятно на что.
- 6. Частые «зашифрованные» телефонные разговоры с незнакомыми людьми, в разговорах и остротах все чаще мелькает особый сленг.
- 7. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.

Среди вещей вас должно насторожить обнаружение:

- 1. Папиросы; приспособления похожие на курительные трубки, только меньших размеров.
- 2. Кусочки фольги.
- 3. Банки с дырочками, пипетки.
- 4. Капли для глаз (обычно используют для предотвращения покраснения глаз).
- 5. Закопченные ложки.
- 6. Шприцы, игла от шприца, резинка для внутривенных инъекций.
- 7. Пузырек с таблетками, марганцовкой; ампула с лекарствами.
- 8. Пустая упаковка из-под лекарств.
- 9. Кусочки ваты с высохшим лекарством.
- 10. Бритвенные лезвий со следами белого порошка или бурой грязи.
- 11. Бутылки с уксусом, ацетоном, пятновыводителем, другими химикатами

Материалы предоставлены: специалистами МБОУ ДО ППМС центра «Шанс»